

2025 年 10 月高等教育自学考试
妇产科护理学(专)试题
课程代码:13196

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 关于子宫肌层肌纤维的排列,下列叙述正确的是
 - A. 分为两层,外层为纵行,内层为环行
 - B. 分为两层,外层为环行,内层为纵行
 - C. 分为三层,内层、外层为环行,中层交织排列
 - D. 分为三层,外层为纵行,内层为环行,中层交织排列
2. 关于产道,下列叙述正确的是
 - A. 骨产道又称大骨盆
 - B. 妊娠期间软产道会变软
 - C. 分娩时软产道不能扩张
 - D. 子宫是软产道的一部分
3. 王女士,阴道分娩后第 1 天,为其提供的护理措施正确的是
 - A. 每日任意时间观察子宫复旧
 - B. 每日温水坐浴促进侧切伤口愈合
 - C. 每日观察恶露的量及性状
 - D. 母乳喂养前肥皂水清洁乳头
4. 新生儿生理性体重下降恢复至出生体重,一般在出生后
 - A. 3~5 天
 - B. 7~10 天
 - C. 2 周左右
 - D. 3 周左右



5. 正常新生儿生理性黄疸达到高峰是在出生后
A. 2~3 天
B. 4~5 天
C. 7~10 天
D. 2 周左右
6. 某女, 停经 50 天, 诊断为宫内孕, 阴道少量出血 2 天, 有轻微腹痛, 该患者可能的情况是
A. 先兆流产
B. 难免流产
C. 不全流产
D. 完全流产
7. 某孕妇, 既往体健, 孕 28 周查体发现血压 140/90mmHg, 蛋白尿 (+), 伴有上腹部不适, 可能是
A. 子痫
B. 妊娠期高血压
C. 子痫前期
D. 慢性高血压
8. 各种类型肝炎均可发生于妊娠期, 其中最常见的病毒类型是
A. 甲型
B. 乙型
C. 丙型
D. 丁型
9. 诊断巨大胎儿的标准是出生体重达到或超过
A. 3000g
B. 3500g
C. 4000g
D. 5000g
10. 下列属于正常胎位的是
A. 枕右前位
B. 枕左后位
C. 枕左横位
D. 枕右横位
11. 骨盆的对角径小于 11.5cm, 其它径线正常, 属于
A. 均小骨盆
B. 出口平面狭窄
C. 中骨盆狭窄
D. 入口平面狭窄
12. 某待产妇, 产程中出现协调性子宫收缩过强, 无头盆不称情况, 最可能出现
A. 急产
B. 产程停滞
C. 第二产程延长
D. 子宫破裂
13. 某产妇, 38 岁, G₃P₃, 2 小时前娩出一对双胞胎男婴, 产程及产后出血总量约 300ml, 现仍有间歇性阴道出血, 色暗红, 有血块。查子宫软, 宫底在脐上 1 指。考虑该产妇出血的原因可能是
A. 凝血功能障碍
B. 高龄产妇
C. 软产道裂伤
D. 宫缩乏力
14. 某产妇, 妊娠合并糖尿病, 因第二产程延长行胎头吸引器助产术, 关于胎头吸引器的使用, 下列描述正确的是
A. 放置时应避开胎儿囟门
B. 抽吸负压后可立即牵引
C. 使用一般不宜超过 3 次
D. 使用超过 30 分钟应立即停止

15. 关于女性生殖器的自然防御功能, 下列描述正确的是
- A. 两侧大阴唇自然分开
 - B. 阴道杆菌将糖原分解为乳酸, 维持阴道酸性环境
 - C. 宫颈阴道部表面覆盖单层柱状上皮
 - D. 输卵管粘膜上皮细胞纤毛向输卵管伞端方向移动
16. 外阴阴道假丝酵母菌病的主要感染途径是
- A. 性交感染
 - B. 外源性感染
 - C. 间接感染
 - D. 内源性感染
17. 关于宫颈癌的扩散途径, 下列描述正确的是
- A. 早期可经体循环转移到肺
 - B. 淋巴转移与临床期别无关
 - C. 血行转移为主
 - D. 向下沿阴道粘膜蔓延最为常见
18. 关于子宫肌瘤的临床表现, 下列描述正确的是
- A. 月经量多、经期延长, 以浆膜下肌瘤表现突出
 - B. 盆腔包块在膀胱充盈时较明显
 - C. 生长在子宫后壁的肌瘤常引起泌尿系症状
 - D. 生长在子宫前壁的肌瘤常引起排便困难等症状
19. 关于葡萄胎的处理原则, 下列描述正确的是
- A. 诊断成立应立即清除宫腔内容物
 - B. 年龄超过 40 岁患者可直接切除子宫和卵巢
 - C. 年龄大于 35 岁患者应采取预防性化疗
 - D. 子宫小于停经月份者应采取预防性化疗
20. 某女, 40 岁, 因绒毛膜癌脑转移准备进行腰穿, 护士采取的措施正确的是
- A. 向病人解释腰穿的主要目的是为了快速降低颅压
 - B. 腰穿前协助患者采取半卧位, 便于操作
 - C. 操作中注意观察患者的呼吸、脉搏、瞳孔和意识变化
 - D. 腰穿后协助患者头低脚高位 1 小时, 侧卧位 24 小时
21. 某女, 28 岁, 近半年月经频发, 经量正常, 婚后 2 年未孕, 妇科检查: 子宫正常大小, 双附件无异常, 基础体温呈双相型, 最可能的诊断是
- A. 无排卵性功血
 - B. 子宫肌瘤
 - C. 黄体功能不足
 - D. 子宫内膜不规则脱落
22. 关于不孕症的病因, 下列描述正确的是
- A. 男方以性功能异常和内分泌功能障碍居多
 - B. 男方以性功能异常和免疫因素居多
 - C. 女方以排卵障碍和输卵管因素居多
 - D. 女方以子宫因素和宫颈因素居多



23. 关于化疗患者血小板减少的护理, 下列描述正确的是
- A. 血小板低于 $50 \times 10^9/L$ 即有自发出血的可能
 - B. 鼻腔出血时可用 1% 肾上腺素棉球堵塞
 - C. 皮肤瘀斑常出现于上肢近端肢体
 - D. 保持室内空气湿度在 40%
24. 关于避孕药的作用机制, 下列描述错误的是
- A. 杀死精子
 - B. 抑制排卵
 - C. 干扰受精
 - D. 干扰受精卵着床
25. 关于宫颈活体组织检查, 下列描述正确的是
- A. 怀疑宫颈管内有癌变者可行锥切法
 - B. 生殖道亚急性炎症时可行宫颈活体组织检查
 - C. 刮取多个宫颈管内组织, 可放在同一标本瓶内
 - D. 取活检处纱条压迫止血, 应在检查 24 小时后取出

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、简答题: 本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分。

- 26. 简述胎盘剥离的征象。
- 27. 简述妊娠合并心脏病妇女产褥期护理内容。
- 28. 简述晚期产后出血产妇的护理措施。
- 29. 简述子宫内膜癌的处理原则。
- 30. 简述闭经患者的护理措施。

三、论述题: 本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

31. 王女士, 平素月经规律, 末次月经 2025 年 6 月 18 日。停经 6 周 B 超测到妊娠环。
王女士来院建档接受产前检查。
请为其:
- (1) 测算预产期;
 - (2) 进行妊娠早期的健康指导。
32. 某女, 29 岁, 腹腔镜卵巢囊肿剔除术后返回病房后出现恶心、呕吐。
根据以上资料, 请回答:
- (1) 该类患者出现恶心、呕吐的原因;
 - (2) 该类患者的护理措施。

